

矯正治療をおこなう上でのリスク

三橋矯正デンタルオフィス

矯正治療をおこなうことによるリスクは、多かれ少なかれですがあることも事実です。比較的よく聞くところでは歯肉退縮や歯根吸収、また抜歯矯正治療後にほうれい線が深くなるケースなどがあり、女性としては気になることが起こることがあります。矯正治療を検討中の方は、事前に担当の歯科医師と相談して治療にのぞむことをお勧めいたします。

歯ぐきや歯肉に関連するリスク

歯肉退縮

歯肉退縮は一見では分からない程の変化のことが多いですが、歯の移動距離や移動方向によっては顕著に起こることがあります。

特に、非抜歯で歯列の拡大を行った場合や、現状より前方や外側に向かって歯を移動した際に歯肉の退縮が起りやすくなります。

元々、歯肉の退縮がある歯牙は、より退縮が起りやすいです。

知覚過敏（冷たい物が沁みる）

歯肉退縮に付随して、知覚過敏など冷たい物が歯にしみるなどの症状がでることがあります。大抵は一過性で、2～4週ほどで収まりますが、歯肉退縮が顕著に起こると長期に渡り沁みるのが収まらないこともあります。

ブラックトライアングル

叢生（歯の重なり）が多く、歯間部歯肉の量が少ない場合、矯正治療によって歯を動かすことで歯並びが綺麗になっても、歯間と歯肉の境目に黒い三角形の影（ブラックトライアングル）ができる場合があります。

歯牙側面のコンタクト部を多少なり削合して、歯間距離を縮めることで隙間を目立ちにくくすることができますが、抜歯ケースでは、抜歯をしたうえで歯牙を削ると隙間が出来すぎなど、治療方針や歯牙の形態によっては削合が出来ず、ブラックトライアングルが大きく残ることもあります。

動かす歯のリスク

歯根吸収

歯はお口の中に見える「歯冠」と歯茎とアゴの骨の中に埋まっている「歯根」があります。矯正力により歯が動く仕組みは、歯根の周囲のアゴの骨が添加（骨が増える）と吸収（骨

が減る)で変化することで、歯がアゴの骨の中を移動します。歯の移動量に伴い多少なり歯根も変化します。抜歯ケースなど歯根の移動量が大きくなると歯根吸収量も大きくなり、また硬い骨に歯根が当たる位置に歯を動かさなくてはならない場合も吸収量は大きくなります。とは言え、通常は歯根の1~5%程で、その後の歯の健康に影響はないと言われています。ただし、元々歯根が短い短歯根歯では、より吸収が起こりやすくなります。事前の検査結果でその辺のリスクもよく聞いておくことも必要です。

歯面の脱灰

装置を付けるにあたり、現在多く取り入れられている方法がボンディング法といい、接着剤で歯面に装置を付ける方法です。装置を付けるにあたり、歯面を一層エッチング(酸)で溶かして装置を接着します。溶かされた歯面は通常、再石灰化作用により歯面が補強され何ら問題のなく滑沢な歯面(エナメル質)に戻されますが、これも顕微鏡レベルで見ると実際には歯面のデコボコが残ることになります。

また、元々エナメル質の薄い歯や、エナメル質の硬さが柔らかい方は、矯正装置撤去後の歯面が粗造になりやすい場合があります。

インビザラインなどの可撤式装置でブラケットを使用しない場合でも、歯の表面にアタッチメントと言う、プラスチックの出っ張りを付けることがあり、エッチングとボンディングを行います。**カリエスリスク(虫歯)**

矯正措置を装着することによる虫歯のリスクがないとは言えませんが、歯磨きを意識的にしっかりとされている方は虫歯になることはまずありません。

ただし、お子さんは技術的に十分できなかつたり、歯磨きをおぎなりにしがちでブラケットカリエス(装置の周囲が白濁する)がみられることも少なくありません。医院の方で対応出来るのは月一の来院時にクリーニングをするくらいなので、日々のお手入れを家庭で対応して頂くことも必要です。

また、歯が重なっていた部分に歯の移動により虫歯が見つかることがあります。これは矯正により新しくできた虫歯ではなく、元々有った虫歯が見えるようになった場合がほとんどです。

歯肉炎・歯周病リスク

これも歯磨きをしっかりとおこなって頂いていれば新たなリスクはないですが、元々歯肉に炎症がある場合にそのまま矯正治療を行ってしまうと、より状態が悪化してしまう場合があります。矯正治療の前に、歯肉炎・歯周病を治療しておくことが必要です。

矯正装置の中には、奥歯に使用するバンドと呼ばれるものがあります。薄い金属の板を奥歯の周囲に巻いて使用しますが、一部が歯肉に被ったり、歯と歯肉の間に挿入する形で装着します。そのため、歯肉のメンテナンスが自分ではしづらいので、定期的に歯医者さんでクリーニングをお勧めします。バンドを使用せず、ブラケットだけを付けることが出来る場合もありますのでドクターに相談してみて頂けるといいかもしれません。

歯髄(歯の中の神経)への影響

ごくまれに100~200人に1人ほどですが、矯正中に歯髄に炎症が起き強い痛みがでて、場合によって抜髄(歯の神経を取る)が必要になります。これに関しては何か原因がある訳ではなく、予防や予めの対応ができるものではありません。抜髄を行った後に、矯正治療を行うことは可能です。

顔貌に関するリスク

お顔・表情の変化

前歯の位置を大きく動かした場合、特に抜歯して前歯を内側へ移動したり八重歯の犬歯を治した際に、ほうれい線が目立ってくる場合があります。必ずそうなる訳ではないですが、治療後の変化としてそのようになるケースがあります。

笑顔の変化

笑った際に歯の見える量により、笑顔のイメージは変わります。歯の前突を気にされて抜歯治療をされる場合など、歯の角度や見える量の変化によっては笑顔が暗く見えることがあります。

また、骨格的な前突がある場合は、矯正治療により歯列が後退したとしても、歯槽骨・歯肉は前方に残るため、ガムスマイル（笑った際に歯茎が見える）がより目立って見えしまう場合があります。

口腔機能的なリスク

咀嚼（そしゃく）障害

矯正治療中は、やはり食べにくさがありますが、慣れると比較的大丈夫になることがほとんどです。また、装置が破損する恐れがあるため、ナッツ類など硬い物は避けて頂く必要があります。

また、矯正治療を行うことで、治療前よりも噛みにくくなることあるのか？・・・残念ながらその可能性もあります。歯並びが悪くても長年その状態であることにより生体の適応力によりそれほど支障なく食生活が送れている方も多くいます。矯正治療で歯を動かすということはそのバランスの取れている状態を一度崩すことになるため、完全に正しい位置へ歯を移動しない限り、噛み合わせに問題が残ることになります。

前歯だけの部分治療の場合は奥歯を動かさないのが前提なので、その限りではないのですが、インビザラインに代表されるマウスピース矯正で奥歯も動かしてしまうとその後の落としどころが難しく場合によっては噛み難さが残ることがあります。マウスピース矯正を選ばれる際は事前にきちんとドクターにその旨確認を取られることをお勧めします。

発音障害

舌側装置を選択された場合などは、慣れるまでは発音しにくくなる場合があります。また、抜歯治療を行うと、口腔容積が小さくなり舌の動けるスペースが狭まることで、しゃべり難くなられる方がいます。これが一時的で慣れることもありますが、継続することもあります。

その他のリスク

抜歯スペースの閉鎖困難

矯正治療により抜歯した場合、抜歯した隙間が閉じ切らず、またそれ以外の部位に隙間が残る場合があります。上顎白歯の歯根は上顎洞といい鼻の奥の鼻腔の壁に近く、そこは固い骨のため歯牙の動きが制限される場合があります。これは、事前の検査で分かることなので、あらかじめドクターより話が出る場合もあります。

骨隆起

歯に過度な力が加わると歯槽骨の一部の骨が膨らんできたり、歯茎がデコボコしてくる骨隆起が出来る場合があります。骨隆起はよく下顎の犬歯～小白歯の内側の歯茎に小高い膨らみとして見られることがあります。抜歯ケースなどでは前歯歯肉にデコボコした骨の凹凸として出来ることもあります。病的なものではないので、治療が必要な訳ではないですが、見た目的に気になる場合もあります。気になる場合は外科的に削除が可能です。

後戻り

矯正治療には大きく分けて動的治療期間と保定期間の2つの治療段階があります。動的治療期間は器具を付けて積極的に歯を動かす期間で、保定期間は動かし終わった綺麗な歯並びをキープしておく期間です。動的治療期間に比べて保定期間は少しないがしろにされがちですが、折角綺麗に治した歯並びを維持するためにはとても重要です。保定期間で行うことは歯を動かす装置と比べればシンプルですが、何かしら装置を使用して歯牙の動きを保持することになります。取り外し式で患者さんに日々の生活の中で管理してもらうものから、歯牙の裏側にワイヤーを固定して動きを保持するものなどいくつかの種類があります。取り外しの物は外してしまえばお口の中に何も無い状態で快適ですが、歯並びを維持するのを目的なので外しておく時間は短くする必要があります。

当医院で主に歯の裏側にワイヤーを張り付け固定する物で、患者様の協力は必要なく保定が可能な物を使用します。

保定は通常2年程行いますが、2年経ったから絶対に歯が動かないか？と言うとそうでもなく、人が生体として生きている限りいろいろな変化がありその中で歯の位置も変るのが普通です。2年後以降もワイヤーを付け保定を行うことも可能です。その判断は患者様にお任せ致しますが、良い歯並びをなるべく維持されたいのであれば保定装置を付けておくことをお勧めします。

矯正後の歯の移動

保定中であっても思わぬ方向へ歯が移動してしまうことがあります。特に食いしぼりや歯ぎしりがある方や、口腔周囲筋の（舌・唇・頬粘膜）の使い方が独特な方は、注意が必要です。そのような場合は、ナイトガードを使用や、口腔周囲筋の過緊張・習癖を改善するためのトレーニングが効果的です。。

患者様の状況によって起因するもの

矯正治療をするからにはより良い状態へ治したいと思われて治療を行われると思います。しかし、患者様の状態は歯の形やアゴの位置などは一様ではなくすべての患者様を理想的な仕上がりに持っていける訳ではありません。全顎的に治療をおこなったとしても100点満点の仕上がりに出来るケースは5%程でしょうか。大方は90点だったり、80点だったり・・・例えば骨格的にアゴ自体が大きくズレているような方では、矯正治療だけではどんなに頑張っても50点どまり、なんて場合もあります。このような方をより100点に近づけるためには外科手術と矯正治療の併用が必要な訳です。

治療によりどこまでの回復が可能かは初めにドクターからの説明があつて然るべきですが、後々トラブルにならないためにも、患者様としても事前に何処まで可能なのかをきちんとドクターに確認して始めたいところです。

なお、歯並びの仕上がりに影響する問題としては、以下のようなものがあります。

顎の骨の形態的な問題、歯牙の形態的問題、上顎洞と歯根の関係、歯茎の状態、歯根の状態、舌の位置・使い方、噛み癖、歯ぎしり・食いしばり、咬合力、寝ぐせ、姿勢・・・

など、多様な状況が矯正を行った場合の仕上がりに影響を及ぼし、これらの問題が全くない方の方が少ない訳ですから、パーフェクトが難しいのもご理解頂けると思います。

歯が動かない

稀ではありますが、力を掛けているのに全く歯が動かないという場合があります。アンキローシス（骨性癒着：歯と歯槽骨が癒着している）や歯根癒着（隣り合う根同士が癒着している）ことで起こることがあります。事前に予測出来る場合もありますが、癒着部位によっては予測が難しく、この場合は途中で治療をあきらめなくてはならない場合もあります。

その他、予測しえない問題

ここに挙げた以外にも、人間の体は千差万別、まだまだ分からないことも多くあり、予想を超えた問題が起こることがあります。そのような問題が起きた際は、適時説明をさせて頂き対応させて頂くこととなります。

当院では、ささいな相談でも担当医が聞かせて頂きます。

気になる点やご不明な点がありましたら、担当医までご相談ください。

三橋矯正デンタルオフィス

電話番号：03-5200-7117